

Об одном критерии собственности многозначных отображений

Воротников Д.А.^{1,2}

Известна тесная связь между собственностью и замкнутостью однозначных отображений. Например [1], для отображений банаховых бесконечномерных многообразий, обладающих свойством фредгольмовости, эти понятия эквивалентны. В то же время свойство собственности отображения является одним из центральных при построении различных теорий топологической степени.

В этой работе приводится общий критерий собственности для многозначных отображений, близкий по духу к вышеупомянутому свойству фредгольмовых отображений. Критерий приведен в форме двух теорем: прямой и обратной.

1 О мультиотображениях

О свойствах мультиотображений можно подробно узнать, например, в [2]. Мы же здесь отметим лишь элементарные вопросы.

Пусть X, Y - метрические пространства. Многозначным отображением F из X в Y (обозначается $F : X \multimap Y$) называется соответствие, сопоставляющее каждой точке $x \in X$ некое непустое подмножество пространства Y , обозначаемое $F(x)$. Многозначные отображения называют также мультиотображениями.

Для $A \subset X$ образом $F(A)$ называется множество $\{y \in Y | \exists x \in A, F(x) \ni y\}$.

Для $B \subset Y$ полным прообразом $F^{-1}(B)$ называется множество $\{x \in X | F(x) \cap B \neq \emptyset\}$.

В частности, для $y \in Y : F^{-1}(y) = \{x \in X | y \in F(x)\}$.

Если для любого замкнутого $B \subset Y$ множество $F^{-1}(B)$ замкнуто, то F называется *полу непрерывным сверху*.

Если F полу непрерывно сверху и образ $F(x)$ всякой точки $x \in X$ компактен, то образ $F(A)$ всякого компактного $A \subset X$ компактен [2].

Если для любого открытого $B \subset Y$ множество $F^{-1}(B)$ открыто, то F называется *полу непрерывным снизу*.

Отображение F называется *замкнутым*, если для любых последовательностей $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$ из X и $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$ из Y , $y_n \in F(x_n)$ выполнено $y_0 \in F(x_0)$.

Всякое полу непрерывное сверху мультиотображение, у которого образ каждой точки замкнут, является замкнутым [2].

Будем называть многозначное отображение $F : X \multimap Y$ *собственным*, если для любого компактного $B \subset Y$ множество $F^{-1}(B)$ компактно.

Будем называть отображение F *топологически замкнутым*, если для любого замкнутого $A \subset X$ замкнутым будет и $F(A)$.

Замечание. Однозначные топологически замкнутые отображения часто называют просто замкнутыми. В теории многозначных отображений замкнутыми называют несколько другие отображения (см. выше).

Символами R, N, Z будем обозначать соответственно множества действительных, натуральных, целых чисел.

Введем еще два термина.

Мы будем говорить, что множество $A \subset X$ *равномерно телесно*, если пересечение A с любым открытым шаром либо пусто, либо содержит другой открытый шар.

¹Работа поддержана грантом РФФИ №01-01-00425

²Current address: CMUC, Apartado 3008, 3001 - 454 Coimbra, Portugal, mitvorot@mat.uc.pt

Понятно, что любое открытое множество равномерно телесно. Полуинтервалы и отрезки в R также равномерно телесны.

Мы будем называть многозначное отображение $F : X \multimap Y$ почти полунепрерывным снизу, если для любого открытого $B \subset Y$ множество $F^{-1}(B)$ равномерно телесно.

Всякое полунепрерывное снизу мультиотображение, в частности, однозначное непрерывное отображение, почти полунепрерывно снизу.

Вместе с каждым $F : X \multimap Y$ можно рассмотреть многозначное отображение $\tilde{F} : F(X) \multimap X$, которое определяется так: $\tilde{F}(y) = F^{-1}(y)$. Легко видеть, что для $B \subset Y : \tilde{F}(B \cap F(X)) = F^{-1}(B)$. Отметим также, что $\tilde{F}^{-1}(A) = F(A)$ для всех $A \subset X$. Действительно,

$$\begin{aligned} y \in \tilde{F}^{-1}(A) &\Leftrightarrow \tilde{F}(y) \cap A \neq \emptyset \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists x \in A, x \in F^{-1}(y) \Leftrightarrow \exists x \in A, F(x) \ni y \Leftrightarrow y \in F(A). \end{aligned}$$

2 Критерий собственности

Теперь мы сформулируем основной результат работы.

Теорема 1. Пусть X, Y – метрические пространства, $F : X \multimap Y$ почти полунепрерывно снизу. Пусть X полно. Пусть для всякого $y \subset Y$ множество $F^{-1}(y)$ замкнуто, но не содержит ни одного открытого шара. Тогда, если F топологически замкнуто, то F собственна.

Доказательство.

Пусть $y_0 \subset Y$ – произвольная точка. Покажем сначала, что $F^{-1}(y_0)$ относительно компактно. Предположим, что это не так. Тогда по теореме Хаусдорфа $F^{-1}(y_0)$ не имеет конечной 3δ -сети, где $\delta > 0$ достаточно мало. Поэтому $F^{-1}(y_0)$ содержит бесконечную последовательность $z_1, z_2, \dots$ точек, попарные расстояния между которыми не меньше 3δ (если бы таких точек было лишь конечное число $z_1, \dots, z_m$, то остальные точки $F^{-1}(y_0)$ отстояли бы от этих меньше, чем на 3δ ; т.е. $z_1, \dots, z_m$ было бы 3δ -сетью). Вместе с каждой $z_i (i \in N)$ рассмотрим открытый шар $\tilde{G}_i = B(z_i, \delta)$ с центром в z_i радиуса δ . Ясно, что если две точки лежат в разных $\tilde{G}_i$ и $\tilde{G}_j$, то расстояние между ними не менее δ . Рассмотрим теперь в Y открытые шары $B_n = B(y_0, \frac{1}{n}) (n \in N)$. Т.к. F почти полунепрерывно снизу, то $F^{-1}(B_n)$ равномерно телесно. Рассмотрим множество $\tilde{G}_n = \tilde{G}_n \cap F^{-1}(B_n)$. Оно не пусто, т.к. содержит z_n . Т.к. $F^{-1}(B_n)$ равномерно телесно, то найдется какой-нибудь открытый шар, содержащийся в $\tilde{G}_n$. Обозначим этот шар через G_n . По условию теоремы G_n не содержится полностью в $F^{-1}(y_0)$, т.е. найдется $x_n \in G_n, y_0 \notin F(x_n)$. Но $x_n \in G_n \subset F^{-1}(B_n)$. Поэтому найдется $y_n \in B_n$ такое, что $y_n \in F(x_n)$. Т.к. точки x_n лежат в $\tilde{G}_n$, то попарные расстояния между ними не менее δ . Т.е. $\{x_n\}_{n \in N}$ – множество без предельных точек. Поэтому оно замкнуто. Но F топологически замкнуто, поэтому $F(\{x_n\}_{n \in N})$ замкнуто. Но $\{y_n\}_{n \in N} \in F(\{x_n\}_{n \in N})$. Т.к. $y_n \in B_n$, то $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$; получается, что $y_0 \in F(\{x_n\}_{n \in N})$. Но этого не может быть, т.к. для всякого n $y_0 \notin F(x_n)$. Противоречие.

Итак, для всякого y_0 множество $F^{-1}(y_0)$ относительно компактно. Но $F^{-1}(y_0)$ замкнуто по условию. Значит, $\tilde{F}(y_0) = F^{-1}(y_0)$ компактно для всякого $y_0 \in F(X)$.

Далее, $\tilde{F} : F(X) \multimap X$ полунепрерывно сверху. Действительно, если A замкнуто в X , то $\tilde{F}^{-1}(A) = F(A)$ замкнуто в Y , т.к. F топологически замкнуто. Очевидно тогда, что $\tilde{F}^{-1}(A)$ замкнуто и в $F(X)$.

Следовательно (см. п.1.), при мультиотображении $\tilde{F}$ образ любого компактного множества компактен.

Пусть B – компактное множество в Y . Т.к. $F(X)$ замкнуто в Y , то $F(X) \cap B$ компактно (в $F(X)$). Тогда $\tilde{F}(F(X) \cap B)$ компактно. Т.е. $F^{-1}(B)$ компактно, и собственность F доказана.

3 Замечания

Замечание 1. В формулировке теоремы 1 почти полунепрерывность снизу нельзя заменить на полунепрерывность сверху, что показывает следующий пример. Рассмотрим отображение $F : R \rightarrow R$:

$$F(x) = \{x\} \text{ (множество, состоящее из одной точки } x), \text{ если } x \notin Z;$$

$$F(x) = R, \text{ если } x \in Z.$$

Отображение F полунепрерывно сверху и топологически замкнуто. Полный прообраз всякой точки y есть множество $\{y\} \cup Z$. Понятно, что оно замкнуто и не содержит ни одного шара, но не компактно. Поэтому F не собственнo.

Замечание 2. Требование почти полунепрерывности снизу в теореме 1 существенно слабее требования полунепрерывности снизу. Действительно, рассмотрим следующий пример. Пусть отображение $F : R \rightarrow R$ задано так:

$$F(x) = \{|x| + 1\} \text{ при } |x| > 1;$$

$$F(x) = \{|x| + 1, 1 - |x|\} \text{ при } |x| = 1;$$

$$F(x) = \{|x| + 1, 1 - |x|, |x| - 1\} \text{ при } |x| < 1.$$

При отображении F полный прообраз всякой точки конечен, а потому замкнут и не содержит шара. Ясно также, что F топологически замкнуто. Полный прообраз любого открытого множества равномерно телесен, но не обязательно открыт: например, полный прообраз малой окрестности нуля содержит крайние точки $+1$ и -1 . Итак, отображение F удовлетворяет условиям теоремы, но не является полунепрерывным снизу.

4 Обратная теорема

Этот пункт посвящен теореме, которую можно назвать обратной к теореме 1.

Теорема 2. Пусть X, Y – метрические пространства,
 $F : X \rightarrow Y$ – замкнутое мультиотображение. Тогда, если F собственнo, то F топологически замкнуто.

Доказательство.

Пусть A – замкнутое множество в X . Покажем, что $F(A)$ замкнуто. Действительно, пусть $y_n \in F(A)$, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$. Множество $Y_0 = \{y\} \cup \{y_n\}_{n \in N}$ компактно. Поэтому и $F^{-1}(Y_0)$ компактно. Т.к. $y_n \in F(A)$, то найдется $x_n \in A$ такое, что $y_n \in F(x_n)$. Понятно, что $\{x_n\}_{n \in N} \in F^{-1}(Y_0)$. Поэтому $\{x_n\}_{n \in N}$ без ограничения общности сходится; $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Т.к. $x_n \in A$, то $x \in A$. Но F замкнуто, поэтому $y \in F(x) \subset F(A)$. Итак, $F(A)$ замкнуто. Теорема доказана.

Литература.

1. Борисович Ю.Г., Звягин В.Г., Сапронов Ю.И. Нелинейные фредгольмовы отображения и теория Лере – Шаудера // УМН, 1977. - Т.32. - Вып.4. - С.3-54.
2. Борисович Ю.Г., Гельман Б.Д., Мышкис А.Д., Обуховский В.В. Введение в теорию многозначных отображений. - Воронеж: Изд. Воронежского университета, 1986.-104с.